


Geleceęi Keřfet!

Kanatlı Saęlıęı ve Verimlilięini Koruyan Yeni Ürün Grupları



ZymFlor Poultry



Yeni Nesil Biyolojik Ürün

SAĞLIKLI BARSAK, SAĞLIKLI YAŞAM

Antibiyotikler ve intestinal hastalıklar, yem değişimi, iklim değişiklikleri, sevk stresi barsak florasını bozar

Özellikleri

- Kanatlılarda yukarıda belirtilen durumlarda sindirim sistemi sağlığını doğal yollardan koruyan bir üründür.
- Probiyotik, prebiyotik ve enzim takviyesi ile sindirim sisteminde patojen bakterileri uzaklaştırarak koruma altına alınır.
- İshal, sindirilmemiş yem, barsak hasarı, barsak tembelliği gibi sorunları önler. Bağırsıklık sistemini güçlendirir.
- **Türkiye'de yerel kanatlı barsak florasından izole edilen ilk probiyotiktir.**

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağırsıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Kanatlılarda 10 L içme sularına 0,5 g veya 10 kg yemlerine 1g katılıp iyice karıştırılarak gün içerisinde 6-8 saat süre ile verilir.

Pratik Doz: 1 ton canlı ağırlık için günde 5 g yeterlidir.

Uyarılar ve Ters Etkiler: İçme sularına katıldığında suyun klor ve antibiyotik içermemesi gerekir.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü: 18 ay

Ambalajı: 4 g x 50 ad, 50 g x 10 ad

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Probiyotik Prebiyotik-Enzim

İçeriği:


Aktif madde / Active substance	Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Premix level (in 1 kg)	Birimler / Units
Probiyotikler (10 g) Destek (adjunct) kültür ve CE kültür de içermektedir. / Probiotics (10 g) also contain adjunct culture and CE culture.		
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$\geq 1 \times 10^{10}$	CFU
<i>Pediococcus acidilactici</i>	$\geq 1 \times 10^{10}$	CFU
<i>Bacillus subtilis</i>	$\geq 1 \times 10^{10}$	CFU
Prebiyotikler / Prebiotics		
Inulin	100	g
MOS	200	g
Enzimler (100 g taşıyıcı içerisinde) / Enzymes (in 100 g carrier)		
Xylanase	2.200.000	BXU
Cellulase	270.000	FPUi
Glucanase	100.000	FBG
Phytase	1.000.000	PPU
Taşıyıcılar / Carriers		
Maltodextrine	590	g

CFU: Koloni Oluşturan Birim / Colony Forming Unit



İşletme Onay No: aTR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

Bio-AminoVit *Poultry*



Yüksek Direnç

Güçlü İçeriği sayesinde
vücut direncini
ve immüniteyi artırır

EFERVESAN

İLK 4'LÜ KOMBİNASYON

Özellikleri

- Kanatlılarda prebiyotik, vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılayan beslenme ürünüdür.
- Tüy, deri sağlığı, kemik gelişimi ve stres durumlarında kapasitenin iyileşmesini sağlar.
- İçerdiği prebiyotikler, barsaktaki probiyotiklerin etkisini artırmanın yanında sindirimi düzenler, vitamin sentezi ve mineral madde emilimini artırır.
- Efervesan özelliği ile çok kolay eriyerek homojen bir dağılım sağlar.
- **Dörtlü kombinasyonu ile Türkiye'de ilk ve tek ürün.**

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Kanatlılarda prebiyotik, vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılamak amacıyla koruyucu olarak 10 L içme suyuna 0,5 g veya 10 kg yemlerine 1 g iyice karıştırılarak verilir. Pratik doz: 1 ton canlı ağırlık için günde 5 g yeterlidir.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Vitamin D3 içerdiğinden, vitamin D2 içeren ürünlerle kullanılması yasaktır. Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven ve maske takılmalıdır.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü: 24 ay

Ambalajı: 4 g x 50 ad, 50 g x 10 ad

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Prebiyotik-Vitamin Mineral-Amino Asit

İçeriği:


Aktif madde ve Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Active substance and premix level (in 1 kg)	
Vitaminler/Vitamins	İz Mineraller / Trace Minerals
Vitamin A 30.000.000 IU	Çinko / Zinc 840 mg
Vitamin D3 5.000.000 IU	Bakır / Copper 600 mg
Vitamin E 30.000 mg	Selenyum / Selenium 20 mg
Vitamin K3 10.000 mg	Amino Asitler / Amino Acids
Vitamin C 150.000 mg	DL-Methionine 20.000 mg
Vitamin B1 20.000 mg	Prebiyotikler / Prebiotics
Vitamin B2 25.000 mg	Inulin 150.000 mg
Niacin 30.000 mg	MOS 132.090 mg
Choline chloride 1.000 mg	Koruyucular / Preservative
Pantothenic acid 10.000 mg	Sodium propionate 50.000 mg
Vitamin B6 2.000 mg	Taşıyıcılar / Carriers
D-Biotin 40 mg	Magnesium sulphate 10.000 mg
Folic acid 1.000 mg	Sodium bicarbonate 300.000 mg
Vitamin B12 10 mg	Potassium chloride 17.400 mg



İşletme Onay No: aTR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

ZoeMultienzyme

Sindirim Enzimleri



Yemden yüksek yararlanım

Kanatlılar tek mideli hayvanlardır. Bu nedenle selüloz gibi kompleks şekerleri sindiremezler. Kanatlıların yemlerini selüloz içeriği yüksek olan tahıllar oluşturmaktadır

Özellikleri

- Temel hammaddelerin sindirilebilirliğini artırır.
- Rasyonun metabolik enerjisini %4-7 arasında artırır.
- Mısır yerine buğday, pirinç kepeği gibi alternatif ham maddeler ekonomik olduğu müddetçe kullanılabilir.
- FCR'ı düşürür.
- Rasyonda maliyetleri düşürür.
- Bitkisel protein kaynaklarının kalitesini artırır.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Yemlerin sindirilme derecesini arttırmak amacı ile etlik civciv, etlik piliç, yumurta tavukları ve diğer kanatlılarda 10 kg yeme 5-10 g katılarak kullanılır.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Endo 1,4 beta ksilanaz yönünden, nişasta olmayan polisakkaritler bakımından zengin karma yemler için kullanılır. 6-fitaz yönünden, 1 kg karmal yem için en fazla kullanım miktarı 100 PPU'yu geçmemelidir.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.


Raf ömrü: 24 ay

Ambalajı: 50 g x 10 ad, 25 kg

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

İçeriği:

Aktif madde (1 kg'da) / Active substance	Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Premix level (in 1 kg)	Birimler / Units
Endo - 1,3 (4) - beta glucañase	2.350.000	FBG
Endo - 1,4 - beta glucañase	4.000.000	FBG
Alfa - amylase	400.000	DU
Bacillolysın (protease)	450.000	HUT
Endo - 1,4 - beta xylanase	20.000.000	BXU
3 - Phytase	1.000.000	PPU



ZoeShell



**Sağlam kemik,
sağlam yumurta kabuğu**

Özellikleri

- Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını standardize eder.
- Bacak problemlerini minimuma indirir, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı optimize eder.
- Şekli bozuk, pütürlü yumurtalarda gözle görülebilir iyileşme sağlar.
- Yumurta kabuk kalitesini iyileştirerek, çatlak, gizli çatlak oranında belirgin bir azalma sağlar.
- Kirli yumurta oranını azaltır.
- Broilerlerde kemik yapısını güçlendirerek kesim öncesi canlı ağırlığa olumlu etki yapar.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Vitamin D3, iz mineral ihtiyacını karşılamak ve yumurta kabuğunu güçlendirmek amacı ile yumurta tavukları ve kafes tavuklarında 10 kg yeme 10 g katılır.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Vitamin D3 içerdiğinden, Vitamin D2 içeren ürünler ile kullanılması yasaktır. Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven, maske takılmalıdır.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü: 24 ay

Ambalajı: 50 g x 10 ad, 25 kg

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Eklem Güçlendirici Kabuk Düzenleyici

İçeriği:


Tanımlayıcı Numaralar / Descriptive Numbers	Aktif madde / Active substance	Katkı adı / Additive name	Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Premix level (in 1 kg)	Birimler / Units
Vitaminler / Vitamins				
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	2.500.00	IU
İz Mineraller / Trace minerals				
E1	Demir/Iron	Iron sulphate	40.000	mg
E 6	Çinko/Zinc	Zinc sulphate	50.500	mg
E6	Mangan/Mangan	Manganese sulphate	30.000	mg
E4	Bakır/Copper	Copper sulphate	10.500	mg
E2	İyot/Iodine	Calcium iodate	1.000	mg
E8	Selenyum/Selenium	Sodium selenite	200	mg
E3	Kobalt/Cobalt	Cobalt sulphate	120	mg
Taşıyıcılar / Carriers				
11.1.2	Öğütülmüş istiridye kabuğu / Grilled oyster shell	Grilled oyster shell	75.000	mg
11.4.2	Sodium bicarbonate	Sodium bicarbonate	25.000	mg
11.1.1.	Calcium Carbonate	Calcium Carbonate	203.925	mg



İşletme Onay No: aTR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

ZoeVit-K

Kanama Önleyici Büyüme Faktörü



**Yüksek oranda A vitamini ve
kan pıhtılaştırıcı Vit K 3 içeren ürün**

50 gr ambalaj ile uygun hedef kitleye ulaşım

Özellikleri

- Kanatlılar da hemoraji, coccidiosis ve intestinal hastalıklar sonucu meydana gelen barsak epitel yıkımlanmasını azaltır, stres durumları ve vücut direncini desteklemek için kullanılır.
- Kanama şekillenen durumlarda vitamin K, kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Kanatlılarda koruyucu olarak 10 L içme suyuna 0,5 g veya 10 kg yemlerine 1 g iyice karıştırılarak 3-5 gün boyunca verilir.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven, maske takılmalıdır.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.


Raf ömrü: 24 ay

Ambalajı: 50 g x 10 ad

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

İçeriği:

Tanımlayıcı Numaralar Descriptive Numbers	Aktif madde / Active substance	Katkı adı / Additive name	Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Premix level (in 1 kg)	Birimler/ Units
Vitaminler / Vitamins				
3a672a	Vitamin A	Retinol acetate	50.000.000	IU
	Vitamin K3	Menadiolone sodium bisulfite	12.000	mg
Antioksidanlar / Antioxidants				
	Antioxidant	Antioxidant (BHT)	10.000	mg
Taşıyıcılar / Carriers				
8.9.1	Maltodextrine	Maltodextrine	928	g



İşletme Onay No: aTR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

ZoeVit-ES

Antioksidan Kas Güçlendirici



**Kanatlılar için yüksek oranda
E vitamini ve selenyum
içeren ürün**

Özellikleri

Kümes hayvanlarında vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak büyüme, fertilité, beyaz kas hastalığı ve stres üzerinde etkilidir.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Kanatlılarda koruyucu olarak 10 L içme suyuna 0,5 g veya 10 kg yemlerine 1 g iyice karıştırılarak 3-5 gün boyunca verilir.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Vitamin E ve Selenyum hassasiyeti olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven, maske takılmalıdır.


Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü: 24 ay

Ambalajı: 50 g x 10 ad

İçeriği:

Tanımlayıcı Numaralar / Descriptive Numbers	Aktif madde / Active substance	Katkı adı / Additive name	Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Premix level (in 1 kg)	Birimler / Units
Vitaminler / Vitamins				
3a700	Vitamin E	α tokoferol acetate	50.000	mg
İz Mineraller / Trace minerals				
E8	Selenium	Sodium selenite	300	mg
Taşıyıcılar / Carriers				
8.9.1	Maltodextrine	Maltodextrine	894	g



BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

İşletme Onay No: α TR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

Biocon-a

Konsantre Toz Dezenfektan



Yüzey ve hava dezenfeksiyonunda etkenlere karşı tam koruma sağlayan pratik kullanım ambalajlı ürün

Özellikleri:

- Tüm virus ailelerine, bakterilere, küf, maya ve mantarlara karşı yüksek ve geniş spektrumlu etki.
- Mukozaya zarar vermez, solunum yolunu tahriş etmez.
- Hem temizler, hem dezenfekte eder.
- İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Formülde dolgu maddesi bulunmaz.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Pratik ambalajında, Araç, ayak havuzları, klinik, operasyon odası ve genel dezenfeksiyonda: 1/100, şap, herpesvirus, su hattı 1/200, tavuk vebası, kuş gribi 1/280, Leptospiroz, listeria, 1/300 sulandırma, her m² yüzey alanına 300 ml solüsyon spreyleme uygulanır, 10 dk teması sağlanır. Su hattının dezenfeksiyonu, 1/200 hazırlanır, hattın tamamına verilir, bir saat beklenir, sonrasında temiz suyla durulanır. Hava spreyi, 1/200 hazırlanır, basınçlı sprej aleti kullanılır. 100 m² alan için 5 L solüsyon yeterlidir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 5 g x 20 ad - 50 g x 10 ad




İçindekiler: %50 Potasyum peroksimonosülfat, ayrıca sinerjik etki oluşturan organik asitler, yüzey aktif maddeler ve inorganik tampon sistemleri bulunur.

ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ



Alphi Granül



Karasineklerin öldürülmesi amacı ile çöp konteynırları, çöplükler, barınaklar ve gübrelik alanlarda boyama tarzı kullanılan kalıcı etkili granül biyosit ürün ve ani etkili solüsyon ürün

Kullanma Şekli

İçerisinde bulunan 10% Azetmethippos ve doğal fenomenler ile eşsiz bir organofosfat grubu karasinek insektisitidir. Havalarda ısındığı ve sıcaklığın devam ettiği mevsimlerde ve her türlü sıcaklık şartlarında, bütün dişi ve erkek ev sineği (Musca Domestika) türlerinde yüksek düzeyde çekici-düşürücü ve öldürücü etkinlik gösterir. Granül yapıda olması ve yüksek emilim kabiliyeti ile hazırlanması çok kolaydır. Aşağıdaki dozlarda kullanılması tavsiye edilir. Uygulama alanında 5 hafta kalıcı etkinlik gösterir. Etkinliğinin aktive edilmesi açısından iki-üç günde bir uygulama alanının yalnızca su püskürterek nemlendirilmesi fayda sağlar.

Uygulama

ALPHI	100 g Ürün İçin	250 g Ürün İçin
Boyama	100 ml su + 100 g Alphi	250 ml su + 250 g Alphi
Cardboard Boyaması	32 ml su + 100 g Alphi	80 ml su + 250 g Alphi

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 bidondan fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 100 g ve 250 g'lık metal kutularda

Karasinek İnsektisit




**KARASİNEK ZEHİRİ
GRANÜL VE SOLÜSYON**



İçindekiler: Azamethippos 10.0%

Nora Pasta

Rodentisit



Fare ve sıçanların öldürülmesi amacı ile kırsal alanlarda, işletmelerde, evlerde, barınaklarda, tarımsal ürün depolarında gerekli görülen yerlere fare kapanları içerisinde uygulanan biyosidal pasta ürün

Kullanma Şekli

İçeriğinde bulunan Difenacoun, antikoagulan etkili özelliği ve pıhtılaşmayı engelleyici yapısı ile Nora Pasta'yı yiyen fareler hemen ölmezler.Ölümün 4 ila 10 gün içinde gerçekleşmesi sonucu diğer fareler ölüm nedenini anlayamazlar. Buda pastanın diğer fareler tarafından cezbedici özelliğini korumasını sağlar. İçeriğinde bulunana yoğun tahıl ve bunun yaydığı aroma kokusu fareler için mükemmel bir çekicilik sunar. Kuvvetli iğirği ile Farelerin küçük bir miktar Nora Pasta'yı tüketmesi yeterlidir. Fareler için bu oran günlük 0.4 g olarak belirlenmiştir. Nora Pasta'nın kıvamı, blok ya da pelet tarzı yemlere oranla fareler tarafından daha çok tercih edilir. Lezzetinin fareler tarafından sevilmesi ve miktarının az olması özelliği ile bir defada fareler tarafından bitirilebilir. Fareler dışındaki diğer canlılar için kötü bir tat duyusunun oluşmasına neden olur, buda ürününü kaza ile tüketilmesini engeller. Buna rağmen kaza sonucu insanlar veya evcil hayvanlar tarafından yenmesi halinde ağız mukozasının boyanması sonucu erken önlem alınmasına olanak sağlar.

Uygulama: Amacına uygun bir etkinlik yakalayabilmek için gübrelik alanlar, yem depoları ve benzeri yerlere konulan fare istasyonları içinde uygulanmalıdır. Pastaların fare istasyonlarına konulurken eldiven kullanılması farelerin insan kokusu almamaları için dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Kapalı ve açık alanlarda fare ve sıçanların göçü güzergahlarına yem kapanları koyun.	Farelerin yem kapanlarına her 3-5 metrede 9 adet (90 g) konulmalıdır. Bir farenin ölmesi için yemesi gereken miktar 0.4 g'dır.	Yem kapanlarını özellikle ilk 10 gün içinde sıkı kontrol ediniz. Yem kapanlarında azalan ve yenilen yemleri yenisi ile değiştirin. Bu işleme yemlerin azalmamaya bağlı olarak ana kadar devam edin.
Sıçan		Sıçanların yem kapanlarına her 5-10 metrede 13 adet (135 g) konulmalıdır. Bir sıçanın ölmesi için yemesi gereken miktar 9 g'dır.	

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 koliden fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.Fare istasyonlarında kalmış, yenmemiş ya da yarısı yenmiş pastaları gelişi güzel çevreye atmayınız. Yasal mevzuatlar içinde imha ediniz.

Ticari Takdim Şekli: 90 g - 250 g, 500 g, 5 kg ve 10 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmuştur.



FARE ZEHİRİ PASTA



İçindekiler: Difenacoun 0,005 %, Bitrex 0,001 %
Doğal Gıda Fenomenleri (Ayçiçeği-Buğday Unu-Balık Yağı)

Maggots SG



Karasinek larvalarının öldürülmesi amacı ile gübrelik alanlara, su birikintilerine ve çöplük alanlara kullanılan kalıcı etkili granül biyosidal ürün

KULLANMA ŞEKLİ

İçeriğinde bulunan 2% Cyromazine karasinek larvalarının 3. pupa döneminde normal deri değişimini engelleyerek etkinlik gösterir. Bu şekli ile pupa deri değişimini tamamlayamadığından dolayı bir sonraki evreye geçmeden ölür. Uygulama alanında 3 hafta kalıcı etkinlik gösterir. Havaaların ısındığı mevsim başlangıcından hava sıcaklıklarının devam ettiği süre boyunca kullanılabilir. Granül yapısı itibarı ile farklı çevresel şartlar için 3 farklı kullanım şekli vardır.

Kuru Uygulama: Islak ve gübrelik alanlara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Spreyleme: Kuru ve samanlık altlıklara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Sulama: Kuru ve çöplük alanlara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Aşağıdaki dozlarda kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

MAGGOTS	250 g Ürün (10 m ² Alan için)
Kuru Uygulama	Serpme Tarzı Uygulama (250 g Maggots 10 m ² için)
Spreyleme	4 L su + 250 g Maggots 10 m ² için
Sulama	10 L su + 250 g Maggots 10 m ² için

Spreyleme ve Sulama için: Uygulama şekline göre yandaki tabloda belirtilen su miktarı hazırlama ölçeğine konulur. Üzerine **MAGGOTS** granül dökülür, oluşan solüsyon içinde granül homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır.


ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

+5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 bidondan fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500 g ve 1-5 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Karasinek Larvasit



İÇİNDEKİLER: Cyromazine 2 %

Hayat için

Barsağı Korursanız, Tüm Vücudu Korursunuz



CMA Biyoteknoloji ve İlaç San. Tic. A. Ş.

Cevizli Mah. Zuhâl Cad. A6 Blok No: 46 F/40

34846 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (+90) 216 939 82 62

Faks: (+90) 216 939 82 72

www.cmabiotechnology.com

info@cmabiotechnology.com